

JMTO 臨床試験業績報告書

(第 18 集)

JMTO データセンター編

2020 年 7 月

URL:<http://www.jmto.org>

(目 次)

1. 卷頭言	1
2. JMTO LC00-01 (phase I)	3
3. JMTO LC00-02 (phase II)	5
4. JMTO LC00-03 (phase III)	7
5. JMTO LC00-04 (LC00-03 付隨研究)	9
6. JMTO LC00-03 (付隨解析 1)	11
7. JMTO LC00-03 (付隨解析 2)	13
8. JMTO LC02-02 (phase II)	15
9. JMTO LC03-02(アウトカム)	17
10. JMTO LC03-03 (phase I)	19
11. JMTO LC05-01(アウトカム)	21
12. JMTO LC07-01 (phase II)	23
13. JMTO LC07-02 (phase II)	25
14. JMTO LC08-01 (phase II)	27
15. JMTO LC09-01 (phase III)	31
16. JMTO LC12-01 (phase II)	35
17. JMTO LC14-01 (phase II)	39
18. JMTO OC01-01(アウトカム)	43
19. JMTO BC02-01 (phase II)	45
20. JMTO BC08-01 (phase II)	47
21. JMTO PREV07-01 (phase III)	49
22. JMTO PCa10-01 (phase II)	51
23. JMTO PCa10-01A1 (予後調査)	53
24. 中止試験一覧	55
25. 学会・論文 発表一覧	58

卷頭言

JMTO 理事 安宅 信二

ナッジとは？

本巻頭言の執筆時点（2020 年 6 月）においてもコロナ禍収束のめどは立っていない。海外では大都市がロックダウンとなり、我が国においても緊急事態宣言が全都道府県に拡大し健康のみならず経済的損失も計り知れない。所謂 3 密を避けるためテレワーク、Web 会議の導入、キャッシュレス決済の普及などコロナ禍による新しい日常が広がっている。今後第 2 波の懸念もあり、これら情報通信技術の発達は場所や時間にとらわれない柔軟な働き方や行動が受け入れられつつある。医療においてもオンライン診療の普及に繋がるかもしない。

残念ながら今年の JMTO ワークショップは中止となつたが、がん医療における行動経済学について大阪大学大学院の平井啓先生による教育講演が予定されていた。4 月の朝日新聞デジタルに新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため我々がどのように行動すべきかを行動経済学から解説した記事が目に留まつたが平井先生へのインタビューであった。

私が最初に行動経済学に興味を持ったのはダン・アリエリー先生の TED (TED.com) での講演や「予想どおりに不合理」という本（早川書房）である。講演では臓器提供の意思表示についてヨーロッパ諸国間で意思表示の割合が大きく異なつていたとする報告を紹介している。この原因は国による文化や習慣の違いなどではなく、各国の臓器提供意思表示のデフォルト（オプトインかオプトアウト）による違いとされている。以前はクスリを処方するときに処方箋は「後発品への変更には医師の許可が必要」というデフォルトとなつていたと思うが、今の処方箋はジェネリック医薬品への変更不可欄にチェックする書式になつていることを思い出させる。また明日からダイエットするので今日はデザートを食べようなど、目の前の小さな報酬を、遅く得られる大きな報酬より優先してしまうことを繰り返す。このように近視眼的な選択をしがちであるが、「現在バイアス」による先延ばし行動と呼ぶらしい。その他にもフレーミング効果（同じ内容でも見せ方や表現の違い）、埋没コスト、損失回避（利益より損失を過大に評価する）などによる不合理な思考や行動パターンが紹介されている。

このような「人の行動は不合理である」という行動経済学を活用し、実社会での問題解決の方法としてナッジ理論が注目されている。ナッジ（Nudge）とは“肘で軽く突っつく”や“そっと後押しする”という意味の英語で、行動を強制したり金銭的なインセンティブに頼ることなく、人々をより良い選択に導く工夫を指している。理論を提唱したリチャード・セイラ一先生は 2017 年にノーベル経済学賞を受賞している。有名な話としてはオランダのスキポール空港の男子トイレにハエのシールを張ることで飛沫による汚染を 80% 以上減少できたとする実験が知られている。また ATM やコンビニのレジ前の床にあるサインに

より順番に並ぶ様に誘導するなどの例がある。政策や環境問題のみならず、ヘルスケアや予防医学など医療分野でも注目されている。厚生労働省からは「明日から使えるナッジ理論」と題した受診率向上施策ハンドブックが発行されているが、実際に東京都八王子市が取り組んだがん検診受診率向上事業では、フレーミング効果を狙った行動変容により受診率が向上した実績を報告している。言うまでもないが効果の限界や倫理的な配慮など実施するうえで多くの問題点が考えられる。しかしながら医療においても費用をかけずに行動変容を促す動機付けで健診受診率や予防接種率の向上、服薬アドヒアラנס改善、健康に良い食品の選択を高めるなど遠い将来における自身の健康という大きな報酬につながるかもしれないナッジの応用に期待したい。

JMTO LC00-01 (phase I)

切除不能の進行非小細胞肺癌(NSCLC)に対するカルボプラチナ+パクリタキセルの 第 I 相臨床試験

本試験支援機構 : 日本・多国間臨床試験機構

研究グループ :

主任研究者 : 国立療養所近畿中央病院 内科 河原 正明

副主任研究者 : 国立療養所近畿中央病院 呼吸器科 小河原 光正

統計解析責任者 : 富山医科薬科大学 統計・情報科学 折笠 秀樹

研究事務局 : 日本・多国間臨床試験機構 事務局


試験進捗 : 研究終了

登録開始日 : 1999 年 10 月 27 日 登録終了日 : 2000 年 9 月 6 日

治療終了日 : 2000 年 9 月 6 日 追跡終了日 : 2003 年 6 月 17 日

研究概要

シェーマ



研究目的

日本人の切除不能の進行非小細胞肺癌(NSCLC)患者にパクリタキセル 225mg/m² + カルボプラチナ(AUC = 6)投与が許容かを決定する。

*学会・論文については、発表一覧ページを参照。


JMTO LC00-02 (phase II)

進行非小細胞肺癌に対するビノレルビン(VNR)+ゲムシタビン(GEM)+ドセタキセル(DOC)の 3 剤化学療法による臨床第Ⅱ相試験

本試験支援機構	： 日本・多国間臨床試験機構		
研究グループ：			
主任研究者	： 国立療養所近畿中央病院 内科	河原 正明	
副主任研究者	： 国立療養所近畿中央病院 内科	細江 重人	
統計解析責任者	： 富山医科薬科大学 統計・情報科学 折笠 秀樹		
研究事務局	： 日本・多国間臨床試験機構 事務局		
試験進捗	： 研究終了		
登録開始日	： 2000 年 2 月 24 日	登録終了日	： 2000 年 11 月 17 日
治療終了日	： 2001 年 3 月 29 日	追跡終了日	： 2002 年 11 月 17 日

研究概要

シェーマ



研究目的

進行非小細胞肺癌に対する、ビノレルビン+ゲムシタビン 3 コースに引き続き、ドセタキセル単剤 3 コースを行う治療法に関して、安全性を確保しつつ、奏効率、生存期間および毒性を評価することを目的とする。

*学会・論文については、発表一覧ページを参照。


JMTO LC00-03 (phaseIII)

進行非小細胞肺癌に対するビノレルビン+ゲムシタビン+ドセタキセルの 3 剤化学療法
とパクリタキセル+カルボプラチニの 2 剤化学療法との臨床第 III 相比較試験

本試験支援機構	:	有限責任中間法人 日本・多国間臨床試験機構
研究グループ		
主任研究者	:	国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 内科 河原 正明
副主任研究者	:	国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 内科 小河原 光正
統計解析責任者	:	富山医科薬科大学 統計・情報科学 折笠 秀樹
		京都大学医学部附属病院 探索医療センター 手良向 聰
支援機構・助成	:	有限責任中間法人 日本・多国間臨床試験機構
研究事務局	:	有限責任中間法人 日本・多国間臨床試験機構 事務局
試験進捗	:	研究終了
登録開始日	:	2001 年 3 月 29 日 登録終了日 : 2005 年 4 月 13 日
治療開始日	:	2001 年 3 月 30 日 追跡終了日 : 2006 年 3 月 20 日
プロトコル改訂	:	第 2 版作成

研究概要

シェーマ



研究目的

2 つの治療法（ビノレルビン+ゲムシタビン+ドセタキセルとパクリタキセル+カルボプラチニン）の全生存期間および無再発生存期間に対する効果を比較する。両治療の奏効率、治療群毒性を比較する。

*学会・論文については、発表一覧ページを参照。


JMTO LC00-04 (LC00-03 付随研究)

進行非小細胞肺癌に対するビノレルビン+ゲムシタビン+ドセタキセルの 3 剤化学療法
とパクリタキセル+カルボプラチニの 2 剤化学療法との臨床第Ⅲ相試験
(JMTO LC00-03) における治療感受性や予後に関わる遺伝子異常の研究

本試験支援機構	:	有限責任中間法人 日本・多国間臨床試験機構	
研究グループ :			
研究代表者	:	国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 内科	川口 知哉
共同研究者	:	国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 内科	河原 正明
	:	京都大学医学部附属病院 探索医療センター	手良向 聰
	:	国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 臨床研究センター	伊佐 俊一
	:	UC Davis Cancer Center	David R. Gandara
	:	UC Davis Cancer Center	Philip C. Mack
支援機構・助成 :	:	有限責任中間法人 日本・多国間臨床試験機構	
研究事務局	:	有限責任中間法人 日本・多国間臨床試験機構 事務局	
試験進捗	:	研究終了	
登録開始日	:	2001 年 3 月 29 日	登録終了日 : 2005 年 4 月 13 日
追跡終了日	:	—	

研究概要

シェーマ



研究背景

- (1) 遺伝子異常の解析と臨床との関連を調べる研究に関して、米国では臨床試験に参加した症例の臨床検体を用いて（バンク化）、種々の蛋白の発現や DNA の異常と臨床データを比較検討することが行われている。
- (2) がん患者の血清から DNA が抽出可能であることが示されている。抗癌剤の抗腫瘍効果に影響を与えると考えられる遺伝子 MGMT、hMLH1 や、予後との関連が示唆されている DAPkinase 等のメチル化が血清 DNA で検出されている。

研究目的

患者の血清から DNA を抽出して MGMT や hMLH1 や DAPkinase 等のメチル化を測定。Primary endpoint は、分子マーカーと抗癌剤の抗腫瘍効果との関係を比較解析。Secondary endpoint は、分子マーカーと全生存期間との関係を比較解析。なお、ビノレルビン、ゲムシタビン、ドセタキセル、パクリタキセル、カルボプラチニンの薬効、毒性に関連した他の遺伝子が、将来さらに解明される可能性も考慮し、それらの遺伝子と抗腫瘍効果や副作用との関係を検証するために血球成分も採取し冷凍保存する。

*学会・論文については、発表一覧ページを参照。

JMTO LC00-03（付随解析 1）

進行非小細胞肺癌における独立予後因子としてのベースライン好中球数

本研究支援機構	:	有限責任中間法人 日本・多国間臨床試験機構	
研究実施者	:	京都大学医学部附属病院探索医療センター 同上 同上	手良向 聰 岸田 祐介 福島 雅典
		京都大学医学部附属病院外来化学療法部	北野 俊行

研究概要

背景と目的：腫瘍の微小環境に存在する炎症細胞が、癌の進行に不可欠な役割を担っていることが明らかになりつつある。本研究の目的は、進行非小細胞肺癌患者のベースライン好中球数、リンパ球数、単球数が予後に与える影響を調べることである。

対象と方法：化学療法未施行のⅢb/IV期非小細胞肺癌におけるランダム化試験（JMTO LC00-03）の適格393例のうち、欠損データのない388例を解析対象とした。ベースライン時末梢血中の好中球数、リンパ球数、単球数と予後との関連を調べるために比例ハザード回帰モデルを用い、カットオフ値を選択するために最小P値法とブートストラップ再抽出に基づく推定法を用いた。

結果：治療法と予後因子を調整後、好中球数と全生存期間 ($P=0.001$)、無増悪生存期間 ($P=0.024$) との間に統計学的に有意な関連（好中球数が多いほど予後が悪い）が認められた。一方、リンパ球数と単球数については予後との関連は認められなかった。好中球数の最適なカットオフ値を探索したところ、 $4,500/\text{mm}^3$ であった（修正 $P=0.0009$ 、修正ハザード比 : 1.67、95%CI : 1.09–2.54）。

考察：腫瘍と好中球との関係については以下のようないくつかの生物学的データが報告されている。
 - 肿瘍組織内の好中球が腫瘍増殖を促す物質を産生することにより予後に影響する。また、リンパ球やNK細胞などの細胞溶解作用を抑制する。
 - 好中球数増加には炎症性サイトカイン（TNF α など）が関与している。また、コルチゾール分泌と関係がある。
 - 肿瘍がG-CSFやGM-CSFを産生する。

増加した好中球数が予後に直接影響するのか、予後不良の肺癌が宿主の好中球増加を招くのか、予後不良宿主が肺癌に好中球増加で反応するのかなど、好中球数増加と予後との関連の本態やメカニズムは不明である。

結論：質の高い臨床試験データを用いて、化学療法を受けた進行非小細胞肺癌患者でベースライン好中球数が独立した予後因子であることが確認された。好中球数は低コストで容易に測定でき、患者予後の有用な指標となる可能性がある。

*学会・論文については、発表一覧ページを参照。

JMTO LC00-03 (付随解析 2)

初回治療非小細胞肺癌における予後因子としての化学療法誘発性好中球減少症

本研究支援機構	:	一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構	
研究実施者	:	京都大学医学部附属病院探索医療センター	手良向 聰
		同上	岸田 祐介
		同上	福島 雅典

研究概要

背景と目的：がん化学療法において抗腫瘍薬の至適投与量は、理論上は、経時的な血中濃度推移と生存期間のデータに基づき設定されるべきであるが、この方法は実地臨床への適用が難しい。本研究の目的は化学療法に伴う好中球減少が生存期間に関わる因子に、ひいては抗腫瘍薬の至適投与量決定の指標になり得るか明らかにすることである。

対象と方法：進行非小細胞肺癌のランダム化臨床試験（ビノレルビン・ゲムシタビン・ドセタキセル 対 パクリタキセル・カルボプラチニ n=387）(Kubota K, et al. Lancet Oncol 2008) のデータを用い、治療中の好中球減少症の最高グレード、腫瘍反応と全生存期間との関係を解析した。好中球減少症と全生存期間との関係を評価する際、短期間の内に死亡した患者は受けた化学療法のサイクル数が少なく、より重度の好中球減少を起こしにくい、というバイアスが生じる。これを除くため、顆粒球コロニー刺激因子の不適切使用症例 (n=15) を除いた 372 例から、治療開始後全 6 サイクルに相当する 126 日以内の死亡・追跡不能患者 (n=35) を除外し、337 例を解析対象とした上で（ランドマーク解析）、治療サイクル数を多変量解析の調整因子に加えた。他の調整因子として性別、喫煙歴、病期、パフォーマンス・ステータス、体重減少、血清 LDH 値、骨、肝、皮膚への転移の有無を含め、さらに本臨床試験において、治療前の末梢血好中球数増加が予後不良因子であることが確認された (Teramukai S, et al. Eur J Cancer 2009) ため、これを含めた。

結果：好中球減少症のグレードが 0 の群 (n=55) の全生存期間の中央値が 10.5 か月 (95% 信頼区間: 8.2-12.4) であったのに対し、グレード 1-2 の群 (n=46)、3-4 の群 (n=236) では 16.6 か月 (同 13.8-20.7)、17.8 か月 (同 15.0-20.3) であった。多変量解析の結果、グレード 0 の群に対する死亡に関するハザード比は、グレード 1-2 の群、3-4 の群で 0.59 (95% 信頼区間: 0.36-0.97, p=0.036)、0.71 (同 0.49-1.03, p=0.072) であり、グレード 1-2 の群で有意に低く、1-2 の群と 3-4 の群の間に有意差はなかった。好中球減少症と腫瘍の最良反応との組み合わせの解析では、腫瘍反応が部分奏効 (PR) の集団において好中球減少症のグレードが 1-2 の群と 3-4 の群は 0 の群に対し、ハザード比が 0.29 (95% 信頼区間: 0.11-0.80)、0.44 (同 0.21-0.92) と有意に低かった。また、PR かつ好中球減少症のグレードが 0 の群に対し、安定 (SD) かつグレードが 0 の群、1-2 の群、3-4 の群のハザード比は各々 1.08 (同 0.47-2.48)、0.78 (同 0.33-1.87)、0.80 (同 0.38-1.70) と有意な差がなかった。

考察：これらの結果は治療に伴う好中球減少が、抗腫瘍薬の投与量がその作用を完全に発揮するのに十分であるか評価するための指標となる点で重要であり、同時に固形がんの化学療法においては投薬強度 (dose intensity) の上昇による予後の改善には限界があ

ることを示唆している。また、画像上の腫瘍反応は、少なくとも抗腫瘍薬が好中球減少という指標で十分量を投与されない限り、全生存期間の代用にはならないことも示された。

本研究は化学療法開始後 1～2 サイクルで好中球減少症が認められない場合に、予定された抗腫瘍薬の投与量を增量するといった個別化医療の可能性も示唆しており、このような治療法を評価するための前向きランダム化試験の実施が望まれる。

結論：質の高い臨床試験データを用いて、化学療法に伴う好中球減少が生存期間に関わる因子であることが確認された。好中球数は低コストで容易に測定でき、患者予後の有用な指標となる可能性がある。

*学会・論文については、発表一覧ページを参照。


JMTO LC02-02 (phase II)

進展型小細胞肺癌に対する塩酸イリノテカン・カルボプラチ ン 毎週投与による第Ⅱ相臨床試験

本試験支援機構	:	一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構
研究グループ		
主任研究者	:	京都大学大学院医学研究科 集学的がん診療学講座 三尾 直士 (現 国立病院機構 京都医療センター 呼吸器内科)
副主任研究者	:	兵庫医科大学 呼吸器、RCU 科 田端 千春
統計解析責任者	:	兵庫医科大学医学部医学研究科 教学教室 大門 貴志
支援機構・助成	:	一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構
研究事務局	:	一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構
試験進捗	:	研究終了
登録開始日	:	2003 年 12 月 4 日 登録終了日：2006 年 9 月 11 日
追跡終了日	:	2010 年 5 月 14 日

研究概要

シェーマ



研究目的

進展型小細胞肺癌に対するカルボプラチニン+イリノテカンの毎週投与を行う治療法に関して、安全性を確保しつつ、奏効率、生存期間および毒性を評価することを目的とする。

*学会・論文については、発表一覧ページを参照。


JMTO LC03-02(アウトカム)

イレッサ（ゲフィチニブ）使用患者の効果と安全性に関するレトロスペクティブ調査

本試験支援機構	： 有限責任中間法人 日本・多国間臨床試験機構	
研究グループ：		
主任研究者	： 京都大学医学部附属病院 呼吸器外科	和田 洋巳
副主任研究者	： 兵庫医科大学病院 呼吸器外科	田中 文啓
	京都大学大学院医学研究科集学的がん診療学講座	三尾 直士
統計解析責任者	： 京都大学医学部附属病院探索医療センター	手良向 聰
支援機構・助成	： 有限責任中間法人 日本・多国間臨床試験機構	
研究事務局	： 有限責任中間法人 日本・多国間臨床試験機構 事務局	
試験進捗	： 研究終了	
調査登録開始日	： 2003 年 11 月	終了日：2005 年 12 月

研究概要

シェーマ



研究目的

2002 年 7 月 1 日から 2003 年 2 月 28 日までの間に非小細胞肺癌でイレッサ®(ゲフィチニブ)を使用した症例をレトロスペクティブに調査し、イレッサ®(ゲフィチニブ)による有害事象発生や有害事象による死亡に関与するリスク因子、および効果予測因子を明らかにする。

*学会・論文については、発表一覧ページを参照。


JMTO LC03-03 (phase I)

前治療歴のある小細胞肺癌患者を対象とした塩酸イリノテカンとアムルビシン併用
化学療法の第 I 相試験

本試験支援機構	:	一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構
研究グループ :		
主任研究者	:	京都大学大学院医学研究科 集学的がん診療学講座 三尾 直士 (現 国立病院機構 京都医療センター 呼吸器内科)
統計解析責任者:	兵庫医科大学医学部医学研究科 教学教室	大門 貴志
支援機構・助成:	一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構	
研究事務局	:	一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構 事務局
試験進捗	:	研究終了
登録開始日	:	2004 年 6 月 4 日 登録終了日 : 2006 年 8 月 9 日
追跡終了日	:	2006 年 11 月末

研究概要

シェーマ



目的

塩酸イリノテカン(50mg/m²を第1, 8日投与, 1週休薬)と塩酸アムルビシン(第1日目投与、2週休薬)の併用療法におけるアムルビシンの用量制限毒性(Dose Limiting Toxicity; DLT)と最大耐用量(Maximum Tolerated Dose; MTD)を決定し、それに基づき推奨投与量を決定する。また、腫瘍縮小効果、生存期間、有害事象の発生頻度・重篤度を評価し、耐用性を検討する。

*学会・論文については、発表一覧ページを参照。

JMTO LC05-01(アウトカム)

p-N2 非小細胞肺癌完全切除例症例に関するアウトカム調査

本試験支援機構 : 一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構
研究グループ :
主任研究者 : 京都大学医学部附属病院 呼吸器外科 伊達 洋至
(京都大学名誉教授 和田 洋巳)
副主任研究者 : 京都大学医学部附属病院 呼吸器外科 大久保 憲一
(現 東京医科歯科大学附属病院 呼吸器外科)
統計解析責任者 : -
研究事務局 : 一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構 事務局
試験進捗 : 研究終了
調査開始日 : 2007 年 12 月 調査終了日 : 2009 年 12 月

研究概要

シェーマ

2000 年 1 月 1 日から 2004 年 12 月 31 日までの間に
完全切除を受けた pT1-3N2M0 非小細胞肺癌症例



ジャストシステムの Internet Disk ASP ホームページより必要な
ファイルをダウンロード



適格規準の確認



調査票の記入



調査票（電子媒体）は web を介しアップロードする



集積・解析

研究目的

前治療なし p-N2 IIIA 期非小細胞肺癌手術症例を対象にしたアウトカムスタディを行い、臨床病理学的な予後因子の層別による術後療法の生存への効果を比較して検討し、合わせて術後補助療法の年次的な推移を検討し、効果的な補助療法の第 3 相臨床試験の方向性を探索する。


*学会・論文については、発表一覧ページを参照。

JMTO LC07-01 (phase II)

未治療ⅢB/IV期非小細胞肺癌に対するドセタキセル+カルボプラチン併用療法のランダム化第Ⅱ相臨床試験

研究概要

シェーマ



研究目的

未治療ⅢB/IV期非小細胞肺癌患者を対象に、ドセタキセル/カルボプラチニ併用療法の有効性と安全性を確認しファーストラインのオプションに成り得るかを検討し、将来の分子標的薬あるいは新規開発抗癌剤との併用のプラットフォームとする。

*学会・論文については、発表一覧ページを参照。


JMTO LC07-02 (phase II)

超音波気管支鏡下細胞診による肺癌患者の縦隔リンパ節転移の診断に関する妥当性試験

本試験支援機構 : 一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構
研究グループ :
主任研究者 : 兵庫医科大学病院 呼吸器外科 長谷川 誠紀
副主任研究者 : 産業医科大学病院 第二外科 田中 文啓
研究事務局 : 一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構
試験進捗 : 研究終了
登録開始日 : 2008 年 7 月 16 日 登録終了日 : 2010 年 2 月 24 日
追跡終了日 : 2010 年 5 月 17 日

研究概要 :

シェーマ



研究目的

本試験は、切除可能な臨床病期 III 期 N2 肺癌症例を対象として、術前の超音波気管支鏡ガイド下吸引針細部診(以下 EBUS-TBNA)による縦隔リンパ節転移診断の妥当性を前向きに検証すること、を目的とする。本試験における主要評価項目(primary endpoint)として EBUS-TBNA による症例ベースでの縦隔リンパ節診断の感度(真陽性/[真陽性+偽陰性])を、副次的評価項目(secondary endpoint)として EBUS-TBNA の安全性(致死的合併症あるいは死亡症例の割合)および FDG-PET による縦隔リンパ節転移診断の感度および特異度(真陰性/[真陰性+偽陽性])を検討する。


本試験は切除可能肺癌症例における縦隔リンパ節転移診断における EBUS-TBNA の有用性に関する妥当性試験(feasibility study)であり、本試験で EBUS-TBNA の妥当性が検証されれば、EBUS-TBNA による縦隔リンパ節転移診断陽性症例を対象とした術前導入療法に関する第 II または III 相試験を企画する予定である。

*学会・論文については、発表一覧ページを参照。

JMTO LC08-01 (phase II)

未治療進展型小細胞肺癌を対象としたアムルビシン/イリノテカン併用化学療法と
シスプラチニン/イリノテカン併用化学療法の無作為化第Ⅱ相試験

本試験支援機構	:	一般社団法人日本・多国間臨床試験機構
研究グループ :		
主任研究者	:	公益財団法人 大原記念倉敷中央病院機構 倉敷中央病院 呼吸器内科
		吉岡 弘鎮
副主任研究者	:	国立病院機構 京都医療センター 呼吸器内科
		三尾 直士
統計解析責任者 :		独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター (現 横浜市立大学大学院医学研究科 臨床統計学)
		山中 竹春
研究事務局	:	一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構 運営事務局
試験進捗	:	論文投稿準備中
登録開始日	:	2008 年 4 月 登録終了日 : 2014 年 1 月 29 日
追跡終了日	:	2016 年 1 月

研究概要**シェーマ**

研究目的

未治療進展型小細胞肺癌を対象とし、JMTO で行った第 I 相試験 JMTO LC03-03 の結果に基づき、アムルビシン/イリノテカン併用療法の有効性と安全性を無作為化第 II 相試験で検討する。

対象症例

<適格基準>

登録時において、下記の選択基準すべての項目を満たし、除外基準のいずれの項目にもあてはまらない症例を適格とする。

- 1 組織診あるいは細胞診で小細胞癌であることが確認されている症例。
- 2 進展型小細胞肺癌、ED-SCLC、悪性胸水あるいは心嚢水貯留を伴う LD 症例。
- 3 化学療法未治療症例。
- 4 ECOG Performance Status (PS) 0-2 の症例。
- 5 治療開始日より 3 ヶ月以上の生存が期待できる症例。
- 6 脳転移および骨転移に対する緩和的放射線治療 (RT) 症例は、登録可能とする。
ただし、椎体への緩和的 RT は 2 椎体までとする。(参照：除外基準 5)
注：本臨床試験の登録前（初回化学療法前）から計画されている、もしくは既に開始されている緩和的放射線治療症例は登録可能であるが、臨床試験の化学療法開始後に新たに緩和的放射線治療が必要になった場合は PD 扱いとなる。
- 7 主要臓器機能が保たれている症例。（登録前の 2 週間以内のデータとする。ただし 2 週間前の同一曜日の検査値は可とする。）
 - (1) 白血球数 4000/ μ L 以上
 - (2) 好中球数 2000/ μ L 以上
 - (3) 血小板数 10 万/ μ L 以上
 - (4) ヘモグロビン 9.5g/dL 以上
 - (5) 総ビリルビン 1.5mg/dL 以下
 - (6) AST、ALT 100IU/L 以下
 - (7) 血清 Cr (酵素法) 1.5mg/dL 未満
 - (8) Ccr (Cockcroft-Gault 法もしくは実測値(24 時間蓄尿法)) 50 mL/min 以上 Cockcroft-Gault 法で計算する場合は、下記計算式にあてはめて Ccr (推定) を計算する。

$$\text{Ccr (男性)} = [(140 - \text{年齢}) \times \text{体重 (kg)}] \div [\text{血清 Cr(mg/dL)} \times 72]$$

$$\text{Ccr (女性)} = \text{Ccr (男性)} \times 0.85$$
 - (9) PaO₂(SpO₂ で代用可) 70torr 以上 (SpO₂ なら 94% 以上)
 - (10) 心エコー心駆出率 (EF) 60% 以上
(心エコーは登録前 4 週間以内のデータでよいものとする。)
- 8 評価可能病変或いは測定可能病変を有すること。
(RECIST 参照)
- 9 年齢は 20 歳以上、上限はもうけない。
- 10 試験参加について文書で患者本人からインフォームド・コンセントを得ていること。

<除外基準>

次のいずれかに該当する症例は除外する。

- 1 登録時に処置を要する胸水・腹水・心嚢水を有する症例。
但し、瘻着術などによりコントロール後は登録可能とする。
- 2 コントロール困難な心機能異常または心疾患を有する症例。
(悪性高血圧、うつ血性心不全、不安定狭心症、過去 1 年以内に発症している心筋梗塞の既往、治療抵抗性的心室性不整脈など。)
- 3 コントロール不良な糖尿病を有する症例。
- 4 重篤な感染症、あるいは 38 度以上の発熱を有し感染症の合併が疑われる症例。
- 5 胸部への放射線治療を要する症例。
(ただし胸椎骨転移等の椎体への緩和的 RT は 2 椎体までは許容される。
参照：適格規準 6)
- 6 胸部 X 線写真で明らかな間質性肺炎・肺線維症を認める症例。
- 7 自己免疫疾患等で長期にわたりステロイドもしくは免疫抑制剤を使用している症例、もしくは今後使用する必要がある症例。
- 8 下痢(水様性)、腸管麻痺、または腸閉塞を有する症例。
- 9 過去に重篤な薬物アレルギーを示した症例。
- 10 活動性の重複癌(同時性重複癌および無病期間が 5 年以内の異時性重複癌をさす。
ただし、局所治療により治癒と判断される Carcinoma in situ (上皮内癌もしくは粘膜内癌相当の病変は活動性重複癌には含めない。) を有する症例。
- 11 妊娠中、あるいは授乳中、あるいは妊娠の可能性(意思)を有する症例。
- 12 その他、試験担当医師が不適当と判断した症例。

エンドポイント

Primary endpoint : 全生存期間 (1 年生存率)

Secondary endpoint : 無増悪生存期間 (PFS)、腫瘍縮小効果(奏効率)、安全性
(有害事象発生率)

治療計画

A 群 : (アムルビシン+イリノテカン)

B 群 : (シスプラチナ+イリノテカン)

予定症例数、登録期間、追跡期間

予定症例数 : 100 例 (A 群 : 50 例、B 群 : 50 例)

登録期間 : 6 年 (2008 年 4 月～2014 年 3 月)

追跡期間 : 2 年 (2014 年 4 月～2016 年 3 月)

総研究期間 : 8 年 (2008 年 4 月～2016 年 3 月)

登録状況 (2014 年 1 月 29 日症例登録終了)

100 症例、倫理委員会承認済施設 13 施設

参加施設別登録症例数 (n =100)

	症例登録施設	症例数
1	倉敷中央病院	33
2	国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター	19
3	京都桂病院	11
4	広島市立広島市民病院	10
5	京都大学医学部附属病院	6
6	先端医療センター	5
7	大阪警察病院	5
8	神戸市立医療センター中央市民病院	5
9	藤沢市民病院	2
10	日本医科大学附属病院	2
11	国家公務員共済組合連合会 大手前病院	1
12	一宮西病院	1


JMTO LC09-01 (phaseⅢ)

再発非小細胞肺癌における Docetaxel 単独と Docetaxel+TS-1 併用療法のランダム化比較試験

本試験支援機構 : 一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構
研究グループ :
主任研究者 : 国家公務員共済組合 大手前病院 腫瘍内科 河原 正明
副主任研究者 : 独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター
統計解析責任者 : 臨床研究センター 安宅 信二
兵庫医科大学医学部医学科 数学教室 大門 貴志
研究事務局 : 一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構 運営事務局
試験進捗 : 論文投稿準備中
登録開始日 : 2009 年 5 月 20 日 登録中止日 : 2014 年 10 月 20 日

研究概要

シェーマ



研究目的

前化学療法レジメンに対して抵抗性（無効）もしくは再発をきたした非小細胞肺癌に対して 2 次治療以降の化学療法としてドセタキセル+TS-1 併用の有用性を標準的治療法であるドセタキセル単独とランダム化比較において評価し、再発非小細胞肺癌における標準的治療法を確立する。

対象症例

＜適格規準＞

登録時において、下記の選択規準すべての項目を満たし、除外規準のいずれの項目にもあてはまらない症例を適格とする。

- 1) 組織診または細胞診にて非小細胞肺癌と診断されている。
- 2) 切除不能の非小細胞肺癌で、臨床病期は根治照射が不可能なⅢB あるいはⅣ期。
術後再発を含む。
- 3) 測定可能病変を有する。（放射線照射野内病変の場合は不適格とする）
- 4) 前化学療法治療歴が 1 レジメン以上の症例。レジメン数の上限は制限しない。
ただし、ドセタキセルまたは 5-FU 製剤が投与されていない。
プラチナ製剤を含む術前または術後補助化学療法は 1 レジメンとする。
分子標的薬剤による治療は 1 レジメンとするが、前治療が分子標的薬剤のみは対象としない。（除外規準の項参照）
- 5) 前化学療法終了後 4 週間以上経過している。
- 6) 登録前に胸部放射線治療終了から 12 週間以上経過していること。胸郭外の照射については制限しない。
- 7) Performance status (ECOG) が 0-1。
- 8) 年齢が 20 歳以上、75 歳以下。
- 9) 主要臓器（骨髄、心、肺、肝、腎など）機能が十分保持されている。
好中球数 : $\geq 1,500 / \mu \text{L}$
血小板数 : $\geq 100,000 / \mu \text{L}$
ヘモグロビン値 : $\geq 9.5 \text{ g/dL}$
AST 値、ALT 値 : 100 IU/L 未満
総ビリルビン値 : $\leq 1.5 \text{ mg/dL}$
血清クレアチニン値 : \leq 施設基準値正常範囲上限
クレアチニンクリアランス : 60 ml/min 以上 (Cockcroft-Gault 式*に従う)
Cockcroft-Gault 式*による推定クレアチニンクリアランス (Ccr) 値 : $\geq 60 \text{ ml/min}$
- * : 男性 Ccr = 体重 × (140 - 年齢) / (72 × 血清クレアチニン値)
女性 Ccr = 男性 Ccr × 0.85
- 10) 治療開始日より 3 カ月以上の生存が期待される。
- 11) 経口摂取が可能。
- 12) 本試験への参加に対して患者本人より文書での同意が得られている。

<除外規準>

次のいずれかに該当する症例は除外する。

- 1) 重症感染症を合併している症例又は発熱があり重症感染症が疑われる症例。
- 2) 妊婦、授乳中及び妊娠の可能性又は意思がある症例。
- 3) 異時性あるいは同時性の活動性の重複癌、多発癌を有する患者。
- 4) 重篤な薬物アレルギーを有する症例。
- 5) 消化管潰瘍及び出血のある症例（出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎）。
- 6) 胸部単純 X 線写真で明らかな、又は臨床症状のある間質性肺炎又は肺線維症を有する症例。
- 7) 前治療が分子標的薬剤のみの症例。
- 8) 高度の肺気腫、重篤な慢性気管支炎、気管支喘息などの肺疾患を合併している。
- 9) ドレナージを要する胸水、心嚢水の貯留がある。（ドレナージ、癒着術等の治療によりコントロールできた症例は可とする）
- 10) 有症状の脳転移症例。
- 11) 間質性肺炎の既往、コントロール困難な糖尿病、肝障害（肝硬変）、腎障害、狭心症、不整脈及び発症後 3 ヶ月以内の心筋梗塞を有する症例。
- 12) 前治療にドセタキセルまたは 5-FU 製剤の投与歴のある患者。
- 13) その他、重篤な合併症を有する症例。
- 14) その他、主治医が本研究を安全に実施するのに不適当と判断した症例。

エンドポイント

Primary endpoint : 全生存期間

Secondary endpoints : 奏効割合、無増悪生存期間(Progression-free survival:PFS)、有害事象発生割合、重篤な有害事象発生割合

治療計画

- A 群：ドセタキセル単独
B 群：ドセタキセル+TS-1 併用

予定症例数、登録期間、追跡期間

目標症例数：860 例

登録期間： 6 年

追跡期間： 2 年

中間解析： 2 回(1 回目は予定登録数の半数の登録が得られた時点および登録終了後のすべての登録症例がプロトコル治療が終了する時期)

登録状況 (2014 年 10 月 20 日試験中止)

157 症例、倫理委員会承認済施設 26 施設

参加施設別登録症例数 (n = 157)

	症例登録施設	症例数
★ 1	国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター	53
★ 2	大阪警察病院	25
★ 3	国立病院機構 高知病院	18
★ 4	群馬県立がんセンター	15
★ 5	京都大学医学部附属病院	8
★ 6	東京都立墨東病院	7
★ 7	兵庫医科大学病院	6
★ 8	国立病院機構東京病院	5
★ 9	旭川医療センター	4
★ 10	藤沢市民病院	3
★ 11	石川県立中央病院	3
★ 12	国家公務員共済組合連合会 大手前病院	3
★ 13	埼玉県立循環器・呼吸器病センター	2
★ 14	大阪厚生年金病院	2
★ 15	大阪府立済生会中津病院	1
★ 16	獨協医科大学病院	1
★ 17	鳥取大学医学部	1
★ 18	洛和会 音羽病院	—
★ 19	一宮西病院	—
★ 20	旭川医科大学	—
★ 21	国立病院機構 西群馬病院	—
★ 22	国立病院機構 沖縄病院	—
★ 23	高松赤十字病院	—
★ 24	大阪府立急性期・総合医療センター	—
★ 25	高槻赤十字病院	—
★ 26	国立病院機構 愛媛医療センター	—
27	昭和大学藤が丘病院	—
28	自治医科大学附属病院	—
29	国立病院機構 金沢医療センター	—
30	滋賀県立成人病センター	—
31	京都第一赤十字病院	—
32	南京都病院	—
33	島根大学医学部附属病院	—
34	国立病院機構 呉医療センター	—
35	社会保険小倉記念病院	—

★倫理委員会承認済み施設

JMTO LC12-01 (phase II)

ゲフィチニブ単剤療法増悪後の EGFR 遺伝子変異陽性高齢者進行非小細胞肺癌に対する
ドセタキセルまたはペメトレキセド単剤療法とドセタキセルまたはペメトレキセド・
ゲフィチニブ併用療法のランダム化比較第 II 相試験

本試験支援機構 : 一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構

研究グループ :

主任研究者 : 近畿中央胸部疾患センター 臨床研究センター 安宅 信二

副主任研究者 : 近畿中央胸部疾患センター 内科 大町 直樹

統計解析責任者 : 名古屋大学医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター
安藤 昌彦


研究事務局 : 一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構 事務局

試験進捗 : 論文投稿準備中

登録開始日 : 2012 年 9 月 4 日 登録中止日 : 2015 年 8 月 31 日

研究概要

シェーマ



※ドセタキセルもしくはペメトレキセドの薬剤選択は各施設で事前にどちらを使用するか JMTO 試験事務局に申請し、申請した薬剤を使用することとする。

試験デザイン：本試験は、ゲフィチニブ治療反応 EGFR 遺伝子変異陽性高齢者進行非小細胞肺癌を対象とし、ゲフィチニブ治療増悪後の治療として、ドセタキセル/ペメトレキセド・ゲフィチニブ併用療法の有効性と安全性をドセタキセル/ペメトレキセド単独療法とのランダム化比較にて検討する、第 II 相試験である。

研究目的

ゲフィチニブ治療反応 EGFR 遺伝子変異陽性高齢者進行非小細胞肺癌を対象とし、ゲフィチニブ単剤療法増悪後の治療として、ドセタキセル/ペメトレキセドとゲフィチニブ併用療法の有効性と安全性をドセタキセル/ペメトレキセド単独療法とランダム化比較にて検討する。

対象症例

<適格規準>

登録時において、下記の選択規準すべての項目を満たし、除外規準のいずれの項目にもあてはまらない症例を適格とする。

- 1) 組織診もしくは細胞診で非小細胞肺癌と診断されている症例
 - 2) EGFR 遺伝子検査の結果、Exon19 欠失変異もしくは Exon21 ; L858R の変異が確認されている症例（これらの変異のほかに、T790M や Exon18 などの EGFR 遺伝子変異を含む場合も適格とする）
 - 3) ファーストライン治療としてゲフィチニブ治療が行われ、SD 以上の効果が認められた後に PD となった症例。（ただし、CR, PR あるいは SD が 6 か月以上継続されていることが必要）
 - 4) 登録前 3 カ月以上安定したスケジュールでゲフィチニブ内服投与が実施できている症例
 - 5) プラチナダブルレットによる治療が適応とならない症例
 - 6) 根治的放射線療法が不可能なⅢB 期またはⅣ期の進行非小細胞肺癌症例（術後再発例を含む）
 - ★ 術後化学療法が行われた場合、化学療法最終投与日から 1 年以上経過しての再発では、術後化学療法はレジメンに含めない。
 - ★ 姑息的放射線療法は、試験治療開始の 4 週間以上前に終了し、放射線療法の毒性が持続していなければ組み入れ可とする。
 - 7) RECIST 基準で測定可能病変を有する症例（10 mm スライス CT で 20 mm 以上、5 mm スライス CT で 10 mm 以上）
 - 8) ECOG PS が 0～1 の症例
 - 9) 年齢 70 歳以上でプラチナダブルレットによる治療の適応外と判断された症例
 - 10) 主要臓器（心、肺、肝、腎、骨髄など）が維持されている症例
 - ★ 登録日から 14 日以内のデータが下記の内容を満たすこと：2 週前の同一曜日は適
 - ★ TNM 分類は 2010 年 2 月からの新 TNM 分類（肺癌取扱規約 改訂第 7 版）に従う
- ・ 白血球数 : $\geq 4,000/\mu\text{L}$
 - ・ 好中球数 : $\geq 2,000/\mu\text{L}$
 - ・ 血小板数 : $\geq 100,000/\mu\text{L}$
 - ・ ヘモグロビン : $\geq 9.5 \text{ g/dL}$
 - ・ AST、ALT: <100IU/L

- ・総ビリルビン : $\leq 1.5 \text{mg/dL}$
 - ・クレアチニン : $\leq 1.2 \text{mg/dl}$
 - ・SPO₂ > 93% (室内気)
- 11) 治療開始日より 3 ヶ月以上の生存が期待される症例
 - 12) 試験参加について文書で患者本人からインフォームド・コンセントを得ていること。

<除外規準>

次のいずれかに該当する症例は除外する。

- 1) 本試験の計画及び実施に関する患者(試験依頼者及び実施医療機関の従業員又は職員)。
- 2) 術後化学療法が行われた場合で、化学療法最終日より 1 年以内での再発症例
- 3) 明らかな感染症(38 度以上の発熱など)を有する症例
- 4) 急性肺障害・間質性肺炎、薬剤誘発性の間質性疾患、ステロイド治療を要した放射線肺臓炎の既往歴のある患者、又は急性障害・間質性肺炎が併存している徵候のある患者
- 5) ベースライン時の胸部 CT(10mm スライス)で明らかな間質性肺炎または肺線維症を有する症例
- 6) イレウスを合併する症例
- 7) コントロールのつかない下痢症状を有する症例
- 8) 活動性の重複癌を有する症例
(ただし局所治療による治癒と判断される Carcinoma in situ(上皮内癌)、粘膜内癌相当の病変、3 年以 disease-free が確認されている症例、または今後 5 年以上の長期生存が期待できる合併癌の場合は除外症例としない。)
- 9) 重篤なアレルギー歴を有する症例
- 10) 難治性の胃潰瘍もしくは十二指腸潰瘍を有する症例
- 11) コントロールのつかない、胸水、心嚢水の貯留を認める症例
- 12) ステロイド剤の継続的な全身投与(内服または静脈内投与)を受けている症例
- 13) ドセタキセルまたはペメトレキセドの治療歴を有する症例
- 14) その他、重度またはコントロール不良の全身状態(安定していないまたは非代償性の呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患など)を有するなど試験担当医師が不適当と判断した症例

HBV キャリアの場合「免疫抑制・化学療法により発症する B 型肝炎対策ガイドライン」を参照すること http://www.jsh.or.jp/medical/documents/HBV_Guideline_correct.pdf

エンドポイント

Primary Endpoint : 無増悪生存期間 (PFS)

Secondary Endpoints : 奏効率(完全奏効; CR+部分奏効; PR) 病勢コントロール率(DCR) (CR+PR+安定; SD)、全生存期間 (OS)、毒性評価

治療計画

A 群 (ドセタキセル/ペメトレキセド単剤療法群)

B 群 (ドセタキセル/ペメトレキセド・ゲフィチニブ併用療法群)

予定症例数、登録期間、追跡期間

目標症例数： 60 例

登録期間： 最初の被験者が登録されてから 4 年間

追跡期間： 登録終了から 1 年

登録状況 (2015 年 8 月 31 日試験中止)

22 症例、倫理委員会承認済施設 26 施設

参加施設別登録症例数 (n = 22)

	症例登録施設	症例数
★ 1	近畿中央胸部疾患センター	6
★ 2	京都桂病院	4
★ 3	関西医科大学附属枚方病院	3
★ 4	東京病院	2
★ 5	群馬県立がんセンター	2
★ 6	広島市立広島市民病院	1
★ 7	刀根山病院	1
★ 8	高知病院	1
★ 9	高松赤十字病院	1
★ 10	倉敷中央病院	1
★ 11	藤沢市民病院	—
★ 12	長野市民病院	—
★ 13	旭川医療センター	—
★ 14	北野病院	—
★ 15	大手前病院	—
★ 16	旭川医科大学病院	—
★ 17	東京都立 墨東病院	—
★ 18	信州大学医学部附属病院 がん総合医療センター	—
★ 19	高槻赤十字病院	—
★ 20	京都大学医学部附属病院	—
★ 21	愛媛医療センター	—
★ 22	長野赤十字病院	—
★ 23	星ヶ丘医療センター	—
★ 24	兵庫医科大学病院	—
★ 25	鳥取大学医学部附属病院	—
★ 26	大阪警察病院	—
27	大阪医療センター	—
28	大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター	—
29	京都医療センター	—


★倫理委員会承認済み施設

JMTO LC14-01 (phase II)

既治療進行非小細胞肺癌患者に対する nab-paclitaxel : アブラキサン®の有効性・
安全性・至適用量を検討するランダム化第Ⅱ相試験

本試験支援機構	一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構
研究グループ :	
研究代表医師	日本医科大学付属病院 化学療法科/呼吸器内科 久保田 馨
副研究代表医師	日本医科大学付属病院 呼吸器内科 武内 進
統計解析責任者	京都府立医科大学大学院医学研究科 生物統計学 手良向 聰
研究事務局	一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構 事務局
試験 進捗	認定臨床研究審査委員会(CRB)承認、 jRCT 公開(jRCTs031180214)、症例登録終了、データ集積中
登録開始日	2015 年 5 月 27 日 登録終了日 : 2019 年 5 月 27 日
追跡終了日	2020 年 5 月 27 日

研究概要 シェーマ



研究目的

既治療進行非小細胞肺癌患者に対する nab-paclitaxel : アブラキサンの有効性・安全性、至適用量を検討する。

対象症例

<適格規準>

以下の条件を満たす患者を対象とする。

- 1) 組織診または細胞診で非小細胞肺癌(NSCLC)であることが確認されている
- 2) 放射線根治照射が不可能な臨床病期 IIIB/IV または術後再発例
- 3) 年齢が 20 歳以上
- 4) Performance Status (ECOG scale) : 0~1
- 5) RECIST.ver1.1 による測定可能病変を有する
- 6) 少なくとも 1 レジメンはプラチナ製剤を含む併用化学療法の前治療が行われており、病勢進行が確認されている患者。
 - ・EGFR 遺伝子変異例、ALK 転座例においては、それぞれのチロシンキナーゼ阻害剤の投与を受けた患者（プラチナ製剤併用も可）とするが、1 レジメンとしてカウントしないものとする（プラチナ製剤併用の場合はカウントする）。
 - ・術後補助化学療法が行われた患者は最終投与日から 1 年以内、術前補助化学療法が行われた症例は手術日から 1 年以内に再発した場合、補助化学療法を 1 レジメンとしてカウントする。
- 7) 下記の主要臓器機能が十分保たれている
 - ・好中球数 $\geq 1,500/\text{mm}^3$
 - ・血小板数 $\geq 100,000/\text{mm}^3$
 - ・血色素量 $\geq 9.0\text{g/dL}$
 - ・AST \leq 施設規準値上限の 2.5 倍
 - ・ALT \leq 施設規準値上限の 2.5 倍
 - ・総ビリルビン値 $\leq 1.5\text{mg/dL}$
 - ・クレアチニン値 $\leq 1.5\text{mg/dL}$
 - ・末梢神経障害 \leq Grade1
 - ・PaO₂ $\geq 60\text{Torr}$ or SpO₂ $\geq 94\%$
- 8) 3 ヶ月以上の生存が期待できる患者
- 9) 文書による本人の同意が得られている患者

<除外規準>

以下の条件に該当する患者は本試験の対象から除外する。

- 1) パクリタキセルによる前治療を受けた患者
- 2) 化学療法を試験薬投与開始前 4 週間以内、または EGFR-TKI を 2 週間以内に受けた患者
- 3) 根治的放射線照射を試験薬投与開始前 6 週間以内、または局所の姑息的照射を 2 週間以内に施行された患者

- 4) 症候性の脳転移のある患者（臨床的に安定しており、治療を要さない無症候性の既知の脳転移は割付可とする）
- 5) ドレーンによる体腔液排除を要する胸水・腹水・心嚢水貯留例（ピシバニール、タルク、ミノマイシン等による胸膜癒着術が施行され、胸水コントロールの出来ている症例は割付可。ピシバニール以外の抗癌剤は不可。）
- 6) 全身性の抗生物質の投与を要する活動性の感染症を有する(38℃以上の発熱を認める患者など)
- 7) 重篤な合併症（腸管麻痺、腸閉塞、X 線にて明らかな間質性肺炎(ただし放射線照射後の照射野に一致した安定した肺炎像についてはこの限りではない)または肺線維症、コントロールが困難な糖尿病、心不全、腎不全、肝不全、消化管の活動性潰瘍、6 ヶ月以内の心筋梗塞、Grade3 以上の狭心症など）を有する
- 8) アザチオプリン、クロラムブシル、シクロホスファミド、シクロスボリン、メトトレキサート、ステロイドなど免疫抑制薬による治療を要する自己免疫疾患を有する患者
- 9) 活動性の重複癌（同時性重複がんおよび無病期間が 5 年以内の異時性重複癌）を有する患者。ただし局所治療により治癒と判断される子宮頸癌の上皮内癌、および内視鏡で治癒切除が可能な胃癌、大腸癌、および悪性黒色腫以外の切除可能な皮膚癌は活動性の重複癌に含めない。
- 10) 妊婦・授乳婦・妊娠している可能性のある女性、妊娠の意思のある女性、または挙児を希望する男性
- 11) 精神病または精神症状を合併しており試験への参加が困難と判断される患者
- 12) ステロイド剤の継続的な全身投与（内服または静脈内）を受けている患者
- 13) その他、担当医が本試験の参加に不適当と考える患者

エンドポイント

主要評価項目： 無増悪生存期間 Progression Free Survival (PFS)

副次評価項目：・全生存期間 Overall Survival (OS)

・奏効割合 Objective Response Rate (ORR)

・有害事象の発現頻度と程度

治療計画

A 群 : Nab-paclitaxel 100mg/m²

B 群 : Nab-paclitaxel 70mg/m²

予定症例数、登録期間、追跡期間

予定症例数：80 例(各群 40 例)

登録期間：4 年

（1 例目の登録から 4 年間。但し、登録数が目標症例数に達した時点で登録終了）

追跡期間：登録終了後 1 年

総研究期間：5 年

登録状況（2019 年 5 月 27 日症例登録終了）

81 症例、倫理委員会承認済施設設：16 施設

参加施設別登録症例数（n = 81）

	症例登録施設	症例数
★ 1	日本医科大学付属病院	46
★ 2	仙台厚生病院	11
★ 3	日本医科大学多摩永山病院	6
★ 4	大阪警察病院	4
★ 5	近畿中央呼吸器センター	4
★ 6	大手前病院	2
★ 7	長野赤十字病院	2
★ 8	名古屋市立大学病院	1
★ 9	日本医科大学千葉北総病院	1
★ 10	藤沢市民病院	1
★ 11	三井記念病院	1
★ 12	群馬県立がんセンター	1
★ 13	京都医療センター	1
★ 14	兵庫医科大学病院	0
★ 15	日本医科大学武藏小杉病院	0
★ 16	大阪府立急性期・総合医療センター	0

★倫理委員会承認済み施設

JMTO OC01-01(アウトカム)

本邦における進行卵巣癌患者の予後調査・化学療法標準化の提言とその後の予後改善効果

本試験支援機構 : 一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構

研究グループ :

主任研究者 : 東京慈恵会医科大学 産婦人科学講座

落合 和徳

副主任研究者 : 東京慈恵会医科大学 産婦人科学講座

磯西 成治

統計解析責任者 : 京都大学医学部附属病院 探索医療センター

手良向 聰


研究中央事務局 : 東京慈恵会医科大学 産婦人科学講座

試験進捗 : 研究終了

研究概要

シェーマ

1994 年 1 月から 2000 年 12 月の 6 年間に初回手術施行および術後に
補助化学療法を受けたⅢ期、Ⅳ期の卵巣癌の全症例



研究目的

1994 年以降の卵巣癌化学療法の治療成績をレトロスペクティブに調査し、寺島らによって提唱された標準治療が施設間差は正にどのように影響し、また患者の予後改善にどのように寄与したかを検証する。

* 学会・論文については、発表一覧ページを参照。


JMTO BC02-01 (phase II)

進行・再発乳癌に対する Paclitaxel / Doxifluridine 併用化学療法による臨床第Ⅱ相試験

本試験支援機構	有限責任中間法人 日本・多国間臨床試験機構		
研究グループ			
主任研究者	昭和大学附属豊州病院	外科	富永 健
副主任研究者	群馬県立がんセンター	乳腺外科	木村 盛彦
	熊本市民病院	外科	西村 令喜
統計解析責任者	富山医科薬科大学	統計・情報科学	折笠 秀樹
支援機構・助成	有限責任中間法人 日本・多国間臨床試験機構		
研究事務局	有限責任中間法人 日本・多国間臨床試験機構	事務局	
試験進捗	研究終了		
登録開始日	2003 年 5 月 7 日	登録終了日	2005 年 12 月 28 日
追跡終了日	2008 年 12 月		

研究概要

シェーマ

**研究目的**

既治療の進行・再発乳癌を対象に、Paclitaxel (TXL) と Doxifluridine (5'-DFUR) との併用化学療法を行い、その腫瘍縮小効果と安全性を評価する。


* 学会・論文については、発表一覧ページを参照。

JMTO BC08-01 (phase II)

LH-RH analogue+ Tamoxifen 併用療法抵抗性ホルモン受容体陽性閉経前進行・再発乳癌患者に対する LH-RH analogue+ アロマターゼ阻害剤 (Anastrozole) 併用療法の臨床効果の検討

本試験支援機構	一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構
研究グループ：	
主任研究者	熊本市民病院 乳腺内分泌外科 西村 令喜
副主任研究者	熊本大学大学院生命科学研究所 乳腺・内分泌外科 山本 豊 北九州市立医療センター 外科 阿南 敬生
統計解析責任者	京都大学医学部附属病院 探索医療センター 手良向 聰
研究事務局	一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構
試験進捗	研究終了
登録開始日	2008 年 9 月 10 日 登録終了日：2010 年 11 月 17 日
追跡終了日	2011 年 11 月 17 日

研究概要 シェーマ



研究目的

ホルモン受容体陽性の閉経前乳がんの標準的なホルモン療法として行われている LH-RHa + TAM 併用療法に対して failure となった進行・再発乳がん患者に対する、 LH-RHa + Anastrozole 併用療法の奏効率を検討する。併せて、無増悪生存期間、生存期間、臨床的有用率、安全性を検討する。

* 学会・論文については、発表一覧ページを参照。


JMTO PREV07-01 (phaseIII)

腹腔鏡補助下大腸切除術における予防的抗菌薬投与法設定の為の無作為化比較試験

本試験支援機構 : 一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構
研究グループ :
主任研究者 : 国立病院機構 京都医療センター 外科 畑 啓昭
副主任研究者 : 京都大学医学部附属病院 消化管外科 坂井 義昭
統計解析責任者 : 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター
(現 横浜市立大学大学院医学研究科 臨床統計学) 山中 竹春
研究事務局 : 一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構 事務局
試験進捗 : 研究終了
登録開始日 : 2007 年 11 月 7 日 登録終了日 : 2011 年 11 月 25 日
追跡終了日 : 2011 年 12 月 25 日

研究概要

シェーマ



研究目的

腹腔鏡補助下大腸切除術に関する抗菌薬の予防投与において、欧米のガイドラインに従った cefmetazole の術前・術中経静脈投与法に対して、cefmetazole 術前・術中経静脈投与法に加えて kanamycin 及び metronidazole を前日に経口投与する方法を比較し、手術部位感染 (surgical site infection: SSI) の発生をエンドポイントとして、後者の予防効果の優位性を検証する。

* 学会・論文については、発表一覧ページを参照。

JMTO PCa10-01 (phase II)

ホルモン不応性前立腺癌患者に対するドセタキセルとデキサメタゾンによる併用療法の有効性・安全性の検討

本試験支援機構	一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構	
研究グループ：		
主任研究者	奈良県立医科大学附属病院 泌尿器科	平尾 佳彦
副主任研究者	大阪府立成人病センター 泌尿器科	西村 和郎
副主任研究者	名古屋大学医学部附属病院 泌尿器科	後藤 百万
統計解析責任者	京都大学医学部附属病院 探索医療センター (現：京都府立医科大学大学院医学研究科 生物統計学)	手良向 聰
研究事務局	一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構 事務局	
試験進捗	研究終了	
登録開始日	2011 年 2 月 25 日	登録終了日：2014 年 2 月 24 日
追跡終了日	2014 年 7 月 8 日	

研究概要**シェーマ**

デザイン	目標登録症例数 対象症例	評価基準	用法・容量
オープン (非対照)	75 例 外科的または内科的去勢 後に、進行または再燃が確 認された前立腺癌	【有効性】 (主要評価)50%PSA 奏効率 (副次的評価) ・フレア（治療開始後の一 過性 PSA 上昇）の発現率 ・Time to PSA failure 【安全性】 CTCAE(Ver.4.0)による安全 性評価 【その他】 ・dose intensity ・プロトコル治療完遂率	タキソテール注 75mg/m ² 点滴静注、3 週間隔+デキ サメタゾン 1 日 1.0mg、連日経口投与、 最大 10 サイクル

試験デザイン：中央登録方式による多施設共同オープン（非対照）試験

目標症例数：75 例

登録期間：最初の被験者が登録されてから 3 年間

試験期間：最初の被験者が登録されてから 4 年間

中間解析：中間解析は実施しない。但し、20 例の安全性が収集された時点での安全性及び
プロトコル治療完遂率の評価を実施する。

研究目的

1 主目的

ホルモン不応性前立腺癌に対するドセタキセル (75 mg/m²) とデキサメタゾンを併用した場合の 抗腫瘍効果を 50%PSA 奏効率により検討する。

2 副次目的

- ・ホルモン不応性前立腺癌に対するドセタキセル (75 mg/m^2) とデキサメタゾンを併用した場合の安全性を検討する。
- ・ホルモン不応性前立腺癌に対するドセタキセル (75 mg/m^2) とデキサメタゾンを併用した場合のフレア（治療開始後の一過性 PSA 上昇）の発現率を検討する。
- ・ホルモン不応性前立腺癌に対するドセタキセル (75 mg/m^2) とデキサメタゾンを併用した場合の Time to PSA failure を検討する。
- ・ホルモン不応性前立腺癌に対するドセタキセル (75 mg/m^2) とデキサメタゾンを併用した場合の dose intensity を検討する。
- ・ホルモン不応性前立腺癌に対するドセタキセル (75 mg/m^2) とデキサメタゾンを併用した場合のプロトコル完遂率を検討する。

* 学会・論文については、発表一覧ページを参照。

JMTO PCa10-01A1 (予後調査)

JMTO PCa10-01 (ホルモン不応性前立腺癌患者に対するドセタキセルとデキサメタゾンによる併用療法の有効性・安全性の検討) の予後調査

本試験支援機構	一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構		
研究グループ：			
主任研究者	大阪暁明館病院 名誉院長	平尾 佳彦	
副主任研究者	大阪府立成人病センター 泌尿器科	西村 和郎	
副主任研究者	名古屋大学医学部附属病院 泌尿器科	後藤 百万	
統計解析責任者	京都府立医科大学大学院医学研究科 生物統計学	手良向 聰	
研究事務局	一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構 事務局		
試験進捗	研究終了		
調査開始日	2015 年 12 月 16 日	調査終了日：2016 年 12 月 15 日	

研究概要**シェーマ**

デザイン	対象症例	評価項目
後ろ向き 観察研究	JMTO PCa10-01 に登録された全症例（最大 76 例）	<p>【有効性】 (主要評価) 全生存期間 (副次的評価) PCa10-01 終了後の • PSA の推移、臨床症状 • 後治療 • 晩期安全性評価 • デキサメタゾンの継続 • 予後因子、有害事象のリスク因子の検討</p>

調査期間：各施設の倫理委員会承認日から 3 ヶ月

研究期間：JMTO 倫理委員会承認後から 1 年間

研究目的**1-1 主目的**

JMTO PCa10-01 (ホルモン不応性前立腺癌に対するドセタキセル ($75 \text{ mg}/\text{m}^2$) とデキサメタゾン併用療法の有効性・安全性の検討) 試験終了後の全生存期間を検討する。

1-2 副次目的

- PCa10-01 終了後の臨床症状・PSA の推移と後治療の有無・内容を検討する。
- PCa10-01 の治療内容ならびに後治療別にみた生存期間を検討する。
- 生存期間（全生存、無増悪生存）に対する予後因子を検討する。
- PCa10-01 終了後の晚期安全性（血液毒性、臓器障害、糖尿病、骨関連事象を含む）を検討する。
- PCa10-01 終了後のデキサメタゾンの継続・減量の実態（有害事象を含む）を検討する。
- 有害事象のリスク因子を検討する。

*学会・論文については、発表一覧ページを参照。

中止試験一覧

JMTO LC01-01(phase III)

非小細胞肺癌完全切除例に対する経口テガフル・ウラシル配合製剤を用いた術後補助化学療法の有効性に関する無作為化第Ⅲ相臨床試験

主任研究者	:	国立病院機構近畿中央胸部疾患センター外科	松村 晃秀
副主任研究者	:	独立行政法人国立病院機構刀根山病院 外科	前田 元
統計解析責任者	:	(財)先端医療振興財団 臨床研究情報センター	小田 英世
試験中止日 : 2004 年 8 月 31 日			

JMTO LC02-01 (phase II)

ⅢA 期 N2 非小細胞肺癌に対する術前導入療法としてのパクリタキセルとカルボプラチニンの少量分割投与の有効性の検討

主任研究者	:	京都大学医学部附属病院 呼吸器外科	和田 洋巳
副主任研究者	:	兵庫医科大学病院 呼吸器外科	田中 文啓
		京都大学医学部附属病院 呼吸器科	平田 敏樹
統計解析責任者	:	静岡県立大学 薬学部 医薬品情報解析学講座	大門 貴志
試験中止日 : 2005 年 12 月 26 日			

JMTO LC03-04 (LC02-01 付随研究)

非小細胞肺癌に対する術前化学療法の効果予測因子と切除後予後因子の検討 :

JMTO LC02-01 (ⅢA 期 N2 非小細胞肺癌に対する術前導入療法としてのパクリタキセルとカルボプラチニンの少量分割投与の有効性の検討) の附隨研究

主任研究者	:	京都大学医学部附属病院 呼吸器外科	和田 洋巳
副主任研究者	:	兵庫医科大学病院 呼吸器外科	田中 文啓
		京都大学医学部附属病院 呼吸器科	平田 敏樹
統計解析責任者	:	静岡県立大学 薬学部 医薬品情報解析学講座	大門 貴志
試験中止日 : 2005 年 12 月 26 日			

JMTO LC03-01 (phase II)

プラチナ製剤を含む化学療法既治療非小細胞肺癌に対するドセタキセルとゲフィチニブ併用療法の効果の検討

主任研究者	:	京都大学医学部附属病院 呼吸器外科	和田 洋巳
副主任研究者	:	京都大学医学部附属病院 呼吸器内科	三尾 直士
		京都大学医学部附属病院 呼吸器外科	田中 文啓
統計解析責任者	:	(財)先端医療振興財団 臨床研究情報センター	大門 貴志
試験中止日 : 2004 年 5 月 31 日			

JMTO LC04-02 (アウトカム)

非小細胞肺癌における上皮増殖因子受容体(EGFR)遺伝子変異とゲフィチニブの効果に関するプロスペクティブ研究

主任研究者 : 京都大学医学部附属病院 呼吸器外科 和田 洋巳
副主任研究者 : 京都大学医学部附属病院 呼吸器外科 田中 文啓
統計解析責任者 : —
試験中止日 : 2005 年 3 月 31 日

JMTO LC04-03 (phase I / II)

非小細胞肺癌におけるゲムシタビンとティーエスワン併用化学療法の第 I / II 相臨床試験

主任研究者 : 京都大学医学部附属病院 呼吸器外科 和田 洋巳
副主任研究者 : 兵庫医科大学病院 呼吸器外科 田中 文啓
統計解析責任者 : —
試験中止日 : 2005 年 12 月 26 日

JMTO CC02-01 (phase III)

Stage III の結腸癌治癒切除患者の術後アジュバント療法：
「5-FU+アイソボリン+シメチジン」 vs 「5-FU+アイソボリン」 の第 III 相比較試験

主任研究者 : 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター院長 松本 純夫
副主任研究者 : 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 外科学 梅本 俊治
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 外科学 小林 健一
統計解析責任者 : 京都大学医学部附属病院 探索医療センター検証部 手良向 聰
試験中止日 : 2006 年 1 月 31 日

JMTO CC03-01 (CC02-01 付随研究)

大腸癌におけるシアリルルイス X およびシアリルルイス A 抗原発現レベルとシメチジンによる術後再発抑制効果に関する相関研究

主任研究者 : 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター院長 松本 純夫
副主任研究者 : 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 外科学 梅本 俊治
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 外科学 小林 健一
統計解析責任者 : 京都大学医学部附属病院 探索医療センター検証部 手良向 聰
試験中止日 : 2006 年 1 月 31 日

JMTO RO04-01 (phase II)

局所進行膵癌に対する先行化学療法後少量ゲムシタビン・加速多分割放射線同時併用療法の第 II 相臨床試験

主任研究者 : 京都大学医学部附属病院 放射線科 平岡 真寛
副主任研究者 : 熊本大学大学院医学薬学研究部 総合医薬科学部門
生体情報分析医学講座放射線治療学分野 大屋 夏生
京都大学医学部附属病院 放射線科 濵谷 景子
統計解析責任者 : 国立病院機構 九州がんセンター臨床研究部 山中 竹春
試験中止日 : 2008 年 3 月 31 日

JMTO PC-030 (phase II)

限局型小細胞肺癌に対する放射線照射線量増加法のランダム化第Ⅱ相試験

主任研究者	:	広島大学病院 放射線治療科	永田 靖
副主任研究者	:	国立病院機構 京都医療センター 呼吸器内科 国立がん研究センター中央病院 呼吸器腫瘍科 広島大学病院 放射線治療科	三尾 直士 久保田 馨 木村 智樹

統計解析責任者 : (未定)

支援中止日 : 2012 年 3 月 24 日

JMTO LC17-01 (phase II)

EGFR T790M 遺伝子変異陽性で癌性胸膜炎を伴う進行非小細胞肺癌に対するオシメルチニブ第Ⅱ相試験

主任研究者	:	近畿中央胸部疾患センター 臨床研究センター	安宅 信二
副主任研究者	:	近畿中央胸部疾患センター 内科	園延 尚子

統計解析責任者 : 東京大学大学院医学系研究科 生物統計情報学講座

平川 晃弘

試験中止日 : 2018 年 1 月 16 日

学会・論文 発表一覧

LC00-01

学会

河原正明、細江重人、小河原光正、安宅信二、石川秀雄、川口知哉、神谷敦、
沖塩協一、中宣敬、延山誠一、他。

切除不能の非小細胞進行肺癌に対するカルボプラチナ+パクリタキセルの
第 I 相臨床試験(会議録).

肺癌 40 卷 5 号 Page404(2000.09)

論文

Ogawara M, Kawahara M, Hosoe S, et al.

A feasibility study of paclitaxel 225 mg/m² and carboplatin AUC = 6 in untreated
advanced non-small cell lung cancer patients in Japan.

Japanese Journal of Clinical Oncology 2002;32:48-53

LC00-02

学会

細江重人、河原正明、小牟田清、原田博雅、古瀬清行。

進行非小細胞肺癌に対するビノレルビン+ゲムシタビン+ドセタキセルの 3 剤化学療
法による臨床第 II 相試験 (会議録).

肺癌 40 卷 5 号 Page420(2000.09)

河原正明、細江重人。

ジェムザール+ナベルビン+タキソテールの 3 剤併用について(第 18 回日本肺癌学会
肺癌ワークショップ)

Gemcitabine and Vinorelbine Followed by Docetaxel in Patients With Advanced
Non-small-cell Lung Cancer : JMTO LC00-02 Study.

Japanese Journal of Lung Cancer Vol.43 No.7 (2003) pp.946-950

論文

Hosoe S, Komuta K, Shibata K, et al.

Gemcitabine and vinorelbine followed by docetaxel in patients with advanced
non-small-cell lung cancer : a multi-institutional phase II trial of nonplatinum
sequential triplet combination chemotherapy (JMTO LC00-02).

British Journal of Cancer 2003;88:342-347

LC00-03

学会

小牟田清、南誠剛、浅井光子、細江重人、河原正明、原田博雅、柴田和彦、岩本康男、
古瀬清行。

進行型非小細胞肺癌に対する VNB+GEM+Doce の 3 剤化学療法による臨床第 II 相
試験。

日本呼吸器学会雑誌 39 卷増刊 Page175(2001.03)

湊浩一、河原正明、小河原光正、西脇裕、久保田馨、小牟田清、藤田結花、三尾直士、米井敏郎、中野喜久雄、折笠秀樹、福島雅典、古瀬清行。

進行非小細胞肺癌に対する vinorelbine、gemcitabine、docetaxel と paclitaxel、carboplatin の第 3 相比較試験 (JMTO LC00-03) .

日本癌治療学会誌 41 卷 2 号 Page563(2006.09)

所昭宏、河原正明、多田春江、石渡量太、手良向聰、福島雅典、久保田馨、古瀬清行。P-151 進行非小細胞肺癌に対する臨床第 3 相比較試験 (JMTO LC00-03)登録患者の QOL 評価研究。

Japanese Journal of Lung Cancer Vol.47. No.5 (20071010) p.562

論文

Kubota K, Kawahara M, Ogawara M, Nishiwaki Y, Komuta K, Minato K, Fujita Y, Teramukai S, Fukushima M, Furuse K, on behalf of the Japan Multi-National Trial Organisation.

Vinorelbine plus gemcitabine followed by docetaxel versus carboplatin plus paclitaxel in patients with advanced non-small-cell lung cancer: a randomised, open-label, phase III study.

Lancet Oncology 2008;9:1135-42

LC00-04

論文

Gandara D. R., Kawaguchi T., Crowley J., Moon J., Furuse K., Kawahara M., Teramukai S., Ohe Y., Kubota K., Williamson S., Gautschi O., Lenz H. J., McLeod H. L., Lara P.N., Coltman C., Fukuoka M., Saijo N., Fukushima M., Mack P.C.. Japan-USA Common Arm Analysis of Paclitaxel-Carboplatin in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Model for Assessing Population-Related Pharmacogenomics.

Journal of Clinical Oncology 2009;21:3540-3546

Isa S, Kawaguchi T, Teramukai S , Minato K, Ohsaki Y, Shibata K, Yonei T, Hayashibara K, Fukushima M, Kawahara M, Furuse K, Mack P.C..

Serum osteopontin levels are highly prognostic for survival in advanced non-small-cell lung cancer: results from JMTO-LC0004.

Journal of Thoracic Oncology 2009;4:1104-1110

LC00-03 附隨研究 1

学会

手良向聰、北野俊行、岸田祐介、河原正明、久保田馨、小牟田清、湊浩一、三尾直士、藤田結花、米井敏郎、中野喜久雄、坪井正博、柴田和彦、古瀬清行、福島雅典。

進行非小細胞肺癌における予後因子としてのベースライン好中球数。

日本癌治療学会誌 2008;43:800

論文

Teramukai S, Kitano T, Kishida Y, Kawahara M, Kubota K, Komuta K, Minato K, Mio T, Fujita Y, Yonei T, Nakano K, Tsuboi M, Shibata K, Furuse K, Fukushima M. Pretreatment neutrophil count as an independent prognostic factor in advanced non-small-cell lung cancer: An analysis of Japan Multinational Trial Organisation LC00-03.

European Journal of Cancer 2009;45:1950-1958

LC00-03 附隨研究 2

論文

Kishida Y, Kawahara M, Teramukai S, Kubota K, Komuta K, Minato K, Mio T, Fujita Y, Yonei T, Nakano K, Tsuboi M, Shibata K, Atagi S, Kawaguchi T, Furuse K and Fukushima M.

Chemotherapy-induced neutropenia as a prognostic factor in advanced non-small-cell lung cancer: results from Japan Multinational Trial Organization LC00-03.

British Journal of Cancer 2009;101:1537-1542

LC02-02

学会

三尾直士、古瀬清行、河原正明、三嶋理晃。

WS2-4 外来投与を考慮した新たな小細胞肺癌化学療法の試み(JMTO LC02-02 および LC03-03) (小細胞癌の治療戦略, 第 47 回日本肺癌学会総会).

Japanese Journal of Lung Cancer Vol.46 No.5 (2006) p.463

論文

Okishio K, Mio T, Kawahara M, Yoshioka H, Yanagihara K, Daimon T, Furuse K. A Weekly combination of carboplatin and irinotecan for previously untreated extensive disease small cell lung cancer, results of minimum follow-up of 3 years : A multi-center phase II trial JMTO LC02-02.

Japanese Journal of Clinical Oncology 2012;42:387-393

LC03-03

学会

三尾直士、古瀬清行、河原正明、三嶋理晃。

外来投与を考慮した新たな小細胞肺癌化学療法の試み (JMTO LC02-02 および LC03-03) (小細胞癌の治療戦略, 第 47 回日本肺癌学会総会)

Japanese Journal of Lung Cancer Vol.46 No.5 (2006) p.463

久保昭仁、河原正明、高田實、安宅信二、川口知哉、佐々木義明、藤田結花、小牟田清、三尾直士、古瀬清行。

既治療小細胞肺癌に対するイリノテカン／アムルビシン併用臨床第 I 相試験 (JMTO LC03-03)

日本癌治療学会誌 42 卷 2 号 Page512 (2007.09)

論文

Kawahara M, Mio T, Daimon T, Kubo A, Komuta K, Fujita Y, Sasaki Y, Mishima M, Fukushima M, Furuse K.

A phase I study of amrubicin (AMR) and fixed-dose of irinotecan (CPT-11) in relapsed small cell lung cancer (SCLC) -Japan Multinational Trial Organization (JMTO) LC0303.

Journal of Thoracic Oncology 2012;7:1845-1849

LC03-02

学会

中川正嗣、田中文啓、三尾直士、多田春江、西村勉、手良向聰、福島雅典、古瀬清行、三嶋理晃、和田洋巳 ゲフィチニブ（イレッサ）による有害事象および効果に関するレトロスペクティブ調査（JMTO LC03-02）。

肺癌 2004;44:633

Nakagawa M, Teramukai S, Tada H, Furuse K, Tanaka F, Mio T, Mishima M, Wada H, Fukushima M.

Hypoalbuminemia as a risk factor of interstitial lung disease (ILD) during gefitinib treatment in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC).

Pro Am Soc Clin Oncol: Abst#7190, 2005

論文

Nakagawa M, Teramukai S, Tanaka F, Tada H, Nishimura T, Yanagihara K, Furuse K, Wada H, Fukushima M.

Interstitial lung disease in gefitinib treated Japanese patients with non-small cell lung cancer –a retrospective analysis : JMTO LC03-02.

BMC Research Notes 2009;2:157

LC05-01

学会

園部誠、大久保健一、伊達洋至、和田洋巳、一般社団法人日本多国間臨床試験機構. 前治療のない pT1-3N2 非小細胞肺癌完全切除例の予後～JMTO LC05-01 pN2 非小細胞肺癌完全切除例に関するアウトカム調査より～

第 64 回 日本胸部外科学会定期学術集会 2011.10.9-12

論文

Sonobe M, Date H, Wada H, Okubo K, Hamakawa H, Teramukai S, Matsumura A, Nakagawa T, Sumitomo S, Miyamoto Y, Okumura N, Takeo S, Kawakami K, Aoki M, Kosaka S, and The Japan-Multinational Trial Organization.

Prognostic factors after complete resection of pN2 non-small cell lung cancer.

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2013;146:788-795

LC07-01

学会

岡藤浩平、小牟田清、河原正明、吉岡弘鎮、川崎雅之、藤田結花、米井敏郎、大串文隆、久保田 馨、山中 竹春、古瀬 清行。

未治療 3B/4 期非小細胞肺癌に対する CBDCA+DOC 併用療法と CBDCA+PTX 併用療法のランダム化第 2 相臨床試験。

第 51 回日本肺癌学会 2010.11.3-4

論文

Kawahara M, Atagi S, Komuta K, Yoshioka H, Kawasaki M, Fujita Y, Yonei T, Ogushi F, Kubota K, Nogami N, Tsuchiya M, Shibata K, Tomizawa Y, Minato K, Fukuoka K, Asami K, Yamanaka T and The Japan Multinational Trial Organization.

Carboplatin plus either docetaxel or paclitaxel for Japanese patients with advanced non-small cell lung cancer.

Anticancer Research 2013;33:4631-4637

LC07-02

論文

Tanaka F, Hasegawa S, Kondo N, Miyahara R, Date H, Atagi S, Kawahara M, Yamanaka T, Manabe T, Wada H.

A Multicenter Feasibility Study of EBUS-TBNA for Potentially Operable Non-Small Cell Lung Cancer: The JMTO LC07-02 study (UMIN000001280)
Oncology Research and Treatment 2016;39:629-633

LC08-01

学会

Tamiya A, Yoshioka H, Nishimura T, Iwamoto Y, Kim YH, Tomii K, Katakami N, Komuta K, Nishikawa M, Yamaki K, Gemma A, Kawahara M, Atagi S, Yamanaka T, Miyakoshi C, Mio T.

Randomized Phase II Trial of Amrubicin Plus Irinotecan Versus Cisplatin Plus Irinotecan in Chemo-naïve Patients with Extensive-Disease Small-Cell Lung Cancer: Results of The Japan Multinational Trial Organization (JMTO) LC 08-01.
2015 ESMO (abstract #3079 poster)

西村尚志、吉岡弘鎮、安宅信二、岩本康男、金永学、富井啓介、片上信之、小牟田清、西川正憲、弦間昭彦、山木健市、河原正明、興梠陽平、石田直、田宮朗裕、山中竹春、宮越千智、三尾直士。

未治療進展型小細胞肺癌に対するアムルビシン/イリノテカン併用療法の無作為化第 II 相試験(JMTO LC08-01)

第 56 回日本肺癌学会学術集会 2015.11.26

金原正志、吉岡弘鎮、安宅信二、西村尚志、岩本康男、金永学、富井啓介、片上信之、小牟田清、西川正憲、弦間昭彦、山木健市、河原正明、興梠陽平、石田直、田宮朗裕、山中竹春、宮越千智、三尾直士。

未治療進展型小細胞肺癌に対するアムレビシン/イリノテカン併用療法の無作為化試験

JMTO LC0801 最終解析結果

第 57 回日本肺癌学会学術集会 2016.12.21

LC12-01

学会

安宅信二、大町直樹、安藤昌彦、西村尚志、横井崇、田村厚久、湊浩一、金原正志、森雅秀、大串文隆、山本晃義、吉岡弘鎮、河原正明。

高齢者 EGFR 遺伝子変異陽性肺癌に対するゲフィチニブ後の化学療法または化学療法とゲフィチニブ併用療法との比較第 II 相試験

第 15 回日本臨床腫瘍学会学術集会 2017.7.29

LC09-01

学会

安宅信二、大門貴志、小牟田清、岡野義夫、湊浩一、金永学、臼井亮、田端千春、田村厚久、河原正明。

再発非小細胞肺癌におけるドセタキセル単独とドセタキセル+TS-1 併用療法のランダム化比較試験

第 59 回日本肺癌学会学術集会 2018.12.1

OC01-01

学会

Ochiai K, Kuramoto H, Yamashita Y, Tanaka K, Tsukamoto N, Hiura M, Mizutani K, Hoshiai A, Teramukai S, Tada H.

The impact of therapeutic modalities on the outcome of advanced epithelial ovarian cancer patients treated in Japan.

A JMTO study. Proc ASCO 2004;23:471 (abstract #5097)

落合和徳、福島雅典、藏本博行、山下幸紀、田中憲一、齊藤俊章、日浦昌道、水谷勝美、星合昊、岡本愛光、磯西成治、手良向聰、多田春江。

卵巣がんの予後調査（JMTO outcome study）からみたこれからの治療戦略。

Cancer Science 2004;95(Suppl):389

落合和徳、福島雅典、藏本博行、山下幸紀、田中憲一、齊藤俊章、日浦昌道、水谷勝美、星合昊、岡本愛光、磯西成治、手良向聰、多田春江。

卵巣がんの予後調査（JMTO outcome study）からみたこれからの治療戦略。

第 63 回日本癌学会 2004.9.29-10.1

Ochiai K, Kuramoto H, Yamashita K, Tanaka K.I, Saito T, Hiura M, Mizutani K, Hoshiai H, Teramukai S, Tada H.

The impact of therapeutic modalities on the outcome of advanced epithelial ovarian cancer patients treated in Japan. A JMTO study.

J Clin Oncol 22:473s,2004.

Teramukai S, Ochiai K, Tada H, Fukushima M.

A new prognostic index of advanced epithelial ovarian cancer (PIEPOC): A JMTO OC01-01 study.

Proc ASCO 2006 (abstract #5061)

手良向聰, 落合和徳, 多田春江, 福島雅典.

進行卵巣癌の新しい予後指標(PIEPOC).

第 45 回日本癌治療学会総会 京都市 2007.10.24-26

Teramukai S, Ochiai K, Tada H, Fukushima M.

PIEPOC: a new prognostic index for advanced epithelial ovarian cancer—Japan Multinational Trial Organization OC01-01.

J Clin Oncol 2007;25:3302-3306

BC02-01

論文

Nishimura R, Tominaga T, Kimura M, Yanagita Y, Tamaki N, Asaishi K, Okamoto Y, Okuyama N, Takeuchi H, Inaba M and Doi T.

Efficacy of doxifluridine combined with weekly paclitaxel therapy in the treatment of advanced or recurrent breast cancer: results of the JMTO BC01 phase II trial.

Anti-Cancer Drugs 2008;19:911-915

BC08-01

学会

Nishimura R, Anan K, Yamamoto Y, Higaki K, Tanaka M, Shibuta K, Sagara Y, Ohno S, Tsuyuki S, Mase T, Teramukai S.

A multicenter phase II trial of an LH-RH analogue plus an aromatase inhibitor in premenopausal patients with advanced or recurrent breast cancer refractory to an LH-RH analogue plus tamoxifen: JMTO BC08-01.

2012 ASCO (abstract #588)

論文

Nishimura R, Anan K, Yamamoto Y, Higaki K, Tanaka M, Shibuta K, Sagara Y, Ohno S, Tsuyuki S, Mase T, Teramukai S.

Efficacy of goserelin plus anastrozole in premenopausal women with advanced or recurrent breast cancer refractory to an LH-RH analogue with tamoxifen: Results of the JMTO BC08-01 phase II trial.

Oncology Reports 2013;29:1707-1713

PREV07-01

学会

Hata H, Yamaguchi T, Hasegawa S, Nomura A, Hida K, Nishitai R, Yamanokuchi S, Yamanaka T, Sakai Y.

A randomized, multicenter, open-label phase III trial of oral and parenteral versus parenteral antibiotic prophylaxis in elective laparoscopic colorectal surgery: The Japan-Multinational Trial Organization PREV 07-01

2013 ACS (abstract #SP07-2)

畠啓昭、山口高史、長谷川傑、野村明成、肥田侯矢、西駿隆太、山之口賢、山中竹春、坂井義治。

腹腔鏡下大腸切除術における経口抗菌薬の予防効果について. 多施設共同 RCT (JMTO PREV07-01)の結果から.

第 22 回日本消化器関連学会 2014.10.23-26

論文

Hata H, Yamaguchi T, Hasegawa S, Nomura A, Hida K, Nishitai R, Yamanokuchi S, Yamanaka T, Sakai Y.

Oral and Parenteral Versus Parenteral Antibiotic Prophylaxis in Elective Laparoscopic Colorectal Surgery (JMTO PREV 07-01): A Phase 3, Multicenter, Open-label, Randomized Trial.

Ann Surg 2016;263:1085-1091

PCa10-01

学会

田中宣道、西村和郎、岡島英二郎、伊奈研次、小川修、長田浩彦、赤倉功一郎、

辻克和、黒田功、後藤百万、手良向聰、藤本清秀、平尾佳彦。

ホルモン不応性前立腺がん患者に対するドセタキセルとデキサメタゾンによる併用療法の有効性・安全性の検討 : JMTO PCa10-01.

第 103 回日本泌尿器科学会総会 2015.4.18-21

西村和郎、田中宣道、岡島英二郎、伊奈研次、小川修、大家基嗣、赤倉功一郎、仲川嘉紀、山口誓司、植村天受、三好康秀、野々村祝夫、後藤百万、手良向聰、平尾佳彦。

CRPC に対するドセタキセル、デキサメタゾン併用療法における安全性の検討 : JMTO PCa10-01

Evaluation of safety of docetaxel + dexamethazone based chemotherapy in Castration resistant prostate cancer patients (JMTO PCa 10-01 study)

第 53 回日本癌治療学会学術集会 2015.10.29-31

田中宣道、西村和郎、岡島英二郎、伊奈研次、小川修、長田浩彦、赤倉功一郎、辻克和、古平喜一郎、藤本清秀、松浦治、山口誠司、後藤百万、手良向聰、平尾佳彦。CRPC に対するドセタキセルとデキサメタゾンによる併用療法検討 : JMTO PCa10-01

Evaluation of efficacy and safety of docetaxel + dexamethazone based chemotherapy in castration resistant prostate cancer patients (JMTO PCa 10-01 study)

第 53 回日本癌治療学会学術集会 2015.10.29-31

論文

Tanaka N, Nishimura K, Okajima E, Ina K, Ogawa O, Nagata H, Akakura K, Fujimoto K, Gotoh M, Teramukai S, Hirao Y.

The efficacy and safety of docetaxel-based chemotherapy combined with dexamethasone 1 mg daily oral administration: JMTO Pca 10-01 phase II trial. Japanese Journal of Clinical Oncology 2017;47:247-251

PCa10-01A1

学会

田中宣道、西村和郎、岡島英二郎、伊奈研次、小川修、大家元嗣、赤倉功一郎、辻克和、山口誠司、藤本清秀、後藤百万、手良向聰、平尾佳彦、JMTO PCa10-01 study group.

CRPC に対する ドセタキセルとデキサメタゾンによる併用療法予後調査； JMTO PCa10-01 A1

第 55 回日本癌治療学会学術集会抄録集 Page66-1(2017.10)

論文

Tanaka N, Nishimura K, Okajima E, Ina K, Ogawa O, Nagata H, Akakura K, Fujimoto K, Gotoh M, Teramukai S, Hirao Y.

Docetaxel-based chemotherapy combined with dexamethasone 1 mg daily oral administration for castration-resistant prostate cancer: Long-term outcomes. International Journal of Urology 2019;26:797-803

JMTO 臨床試験業績報告書(第 18 集)

令和 2 年 7 月発行

編集者:

一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構 研究推進委員長 手良向 聰

発行者:

一般社団法人 日本・多国間臨床試験機構 理事長 和田 洋巳

印刷会社:

昭和印刷 株式会社